

Citoyens qui sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids)

Unité : %

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Province			
Nouveau-Brunswick	34,1	32,8	30,8
Zones de santé			
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	33,7	31,8	28,3
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	33,2	34,3	31,7
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	35,5	32,7	31,0
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	31,3	32,1	32,4
Zone 5 - Région de Restigouche	36,0	28,7	28,4
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	33,2	30,2	31,9
Zone 7 - Région de Miramichi	38,4	40,9	35,8
Communautés			
Région de Bathurst, Beresford, Petit-Rocher	31,7	26,9	30,5
Région de Bouctouche, Richibucto, Saint-Antoine	39,3	36,7	33,4
Région de Campbellton, Atholville, Tide Head	33,9	31,1	28,8
Région de Caraquet, Paquetville, Bertrand	30,6	23,8	25,4
Région de Dalhousie, Balmoral, Belledune	38,0	26,6	28,0
Dieppe et Memramcook	29,5	28,6	20,8
Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown	38,2	33,9	35,3
Région d'Edmundston, Rivière-Verte, Lac Baker	33,1	32,8	33,2
Région de Florenceville-Bristol, Woodstock, Wakefield	39,4	36,3	38,8
Fredericton	28,5	25,4	25,1
Région de Grand Bay-Westfield, Westfield, Greenwich	29,0	28,2	27,7

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
Région de Grand-Sault, Saint-Léonard, Drummond	32,8	34,0	31,7
Région de Hillsborough, Riverside-Albert, Alma	33,1	43,3	26,4
Kedgwick, Saint-Quentin et Grimmer	19,1	24,7	30,2
Région de Minto, Chipman, Cambridge-Narrows	46,6	41,9	41,8
Région de Miramichi, Rogersville, Blackville	37,6	39,9	31,9
Moncton	31,7	30,9	25,1
Région de Nackawic, McAdam, Canterbury	47,5	38,5	31,1
Région de Neguac, Alnwick, Esgenoopetitj	42,2	47,1	51,4
Région de New Maryland, Kingsclear, Lincoln	32,2	32,5	28,5
Région de Oromocto, Gagetown, Fredericton Junction	38,1	40,4	29,0
Région de Perth-Andover, Plaster Rock, Tobique	37,8	36,6	37,7
Région de Quispamsis, Rothesay, Hampton	28,4	29,2	24,3
Riverview et Coverdale	34,6	27,7	31,6
Région de Sackville, Dorchester, Port Elgin	28,0	32,4	29,5
Saint John, Simonds et Musquash	35,1	36,3	33,9
Salisbury et Petitcodiac	39,3	39,0	48,0
Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé	39,3	33,7	32,6
Région de Shippagan, Lamèque, Inkerman	38,2	33,6	38,2
Région de St. George, Grand Manan, Blacks Harbour	35,1	32,9	34,0
Région de St. Stephen, Saint Andrews, île Campobello	34,2	37,8	34,5
Région de Sussex, Norton, Sussex Corner	35,8	38,2	35,7
Tracadie et Saint-Isidore	34,3	38,8	34,8
Âge			
18 à 64	34,3	33,5	31,4

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
65 et plus	32,4	30,8	28,4
Sexe à la naissance			
Féminin	35,6	32,2	30,5
Masculin	31,9	33,4	31,2
Identité sexuelle			
Identité sexuelle minoritaire	35,9	s.o.	s.o.
Hétérosexuel	34,0	s.o.	s.o.
Langue			
Préfère recevoir les services en anglais	34,7	34,0	31,3
Préfère recevoir les services en français	32,0	28,8	29,4
Identité autochtone			
Autochtone	41,6	39,6	32,3
Non autochtone	33,8	32,5	30,7
Immigrant			
Immigrants	23,8	21,3	s.o.
Non-immigrants	34,2	33,5	s.o.
Niveau de scolarité			
Secondaire ou moins	36,4	35,8	33,2
Études postsecondaires	32,3	30,8	29,3
Revenu du ménage			
Moins de 25 000 \$	34,5	36,0	32,4
De 25 000 \$ à moins de 60 000 \$	36,4	34,2	32,8
60 000 \$ ou plus	32,1	31,0	29,2

	Année 2020	Année 2017	Année 2014
--	---------------	---------------	---------------

Personnes ayant une incapacité

Sans incapacité	30,3	29,8	28,0
Avec incapacité	44,6	43,1	40,8

À propos

Cet indicateur est le pourcentage de citoyens qui sont obèses (auto-déclaré à partir de leur taille et poids).

Source

Sondage sur la santé primaire et Sondage sur les soins primaires

Calculs

Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de répondants qui « ont un IMC plus élevé qu'un seuil spécifique » par le nombre de répondants qui « ont fourni leur taille et leur poids ». L'IMC est obtenu en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Des conversions sont appliquées pour obtenir les bonnes unités de mesure à partir des questions suivantes : Combien mesurez-vous sans chaussures ? Et Combien pesez-vous ?

Notes

L'édition 2020 du sondage de santé primaire s'est déroulée durant la pandémie de COVID-19. Bien que la pandémie n'ait pas eu d'impact sur le taux de réponse pour le sondage, le CSNB a dû évaluer l'impact de la collecte du sondage durant la pandémie. Par conséquent, des analyses statistiques avancées ont été effectuées afin de permettre la comparaison des résultats obtenus en 2020 avec ceux des cycles précédents du sondage de santé primaire. Malgré ces analyses, il est recommandé d'utiliser les données du sondage 2020 avec précaution, surtout en ce qui concerne les données de petites sous-populations ou lors de comparaisons aux autres cycles du sondage.

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	PH_BMI01_2

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon