

Utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques en soins de longue durée

Unité : %

	Année financière 2023-2024	Année financière 2022-2023	Année financière 2021-2022	Année financière 2020-2021
Province				
Nouveau-Brunswick	34,0	33,2	32,4	30,5
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	31,1	30,4	29,5	27,0
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	29,3	27,6	28,2	25,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	25,3	26,7	27,3	29,1
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	33,4	31,5	32,0	30,8
Zone 5 - Région de Restigouche	35,3	35,6	35,8	35,1
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	63,7	62,0	56,7	49,5
Zone 7 - Région de Miramichi	36,2	35,3	30,3	29,9

À propos

Pourcentage de résidents en soins de longue durée qui prennent des antipsychotiques sans avoir reçu un diagnostic de psychose

Source

Système d'information sur les soins de longue durée

Calculs

<https://www.cihi.ca/fr/indicateurs/utilisation-potentiellement-inappropriee-dantipsychotiques-en-soins-de-longue-duree>

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	CIHI-CCRS-002

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon