

Utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques en soins de longue durée

Unité : %

	Année financière 2024-2025	Année financière 2023-2024	Année financière 2022-2023	Année financière 2021-2022
Province				
Nouveau-Brunswick	35,6	34,0	33,2	32,4
Zones de santé				
Zone 1 - Région de Moncton et du Sud-Est	32,4	31,1	30,4	29,5
Zone 2 - Région de Fundy et de Saint John	33,0	29,3	27,6	28,2
Zone 3 - Région de Fredericton et de la vallée	24,7	25,3	26,7	27,3
Zone 4 - Région du Madawaska et du Nord-Ouest	45,6	33,4	31,5	32,0
Zone 5 - Région de Restigouche	40,0	35,3	35,6	35,8
Zone 6 - Région de Bathurst et de la Péninsule acadienne	64,9	63,7	62,0	56,7
Zone 7 - Région de Miramichi	33,6	36,2	35,3	30,3

À propos

Pourcentage de résidents en soins de longue durée qui prennent des antipsychotiques sans avoir reçu un diagnostic de psychose

Source

Système d'information sur les soins de longue durée

Calculs

<https://www.cihi.ca/fr/indicateurs/utilisation-potentiellement-inappropriee-dantipsychotiques-en-soins-de-longue-duree>

Unité	Interprétation	Code du CSNB
%	Valeur basse est souhaitable	CIHI-CCRS-002

Légende

s.o. = Sans objet / donnée non disponible

S = Donnée supprimée pour des raisons de confidentialité ou en raison de la petite taille de l'échantillon