

## Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown

Blissfield, Boiestown, Burtts Corner, Doaktown, Douglas, Estey's Bridge, Hamtown Corner, Killarney Road, Ludlow, McLeod Hill, New Bandon, Royal Road, Saint Marys, Stanley, Tay Creek, Upper Miramichi



n = 276

n = 13 614

Profil démographique <sup>1</sup>		2014 (%)	N.-B.(%)
Groupe d'âge	18 à 34	18,9	24,3
	35 à 54	41,2	36,7
	55 à 64	19,9	18,7
	65 et plus	20,0	20,3
Sexe	Homme	52,3	48,0
	Femme	47,7	52,0
Niveau de scolarité	École secondaire ou moins	38,4	38,7
	Collège ou école de métier	31,0	31,4
	Diplôme universitaire	30,6	29,9
Autochtone	Oui	2,3	3,0
Choix de la langue de service	Français	2,6	25,4
	Anglais	97,4	74,6
Revenu du ménage	Moins de 25 000\$	18,6	19,9
	25 000\$ à 59 999\$	33,7	35,5
	60 000\$ ou plus	47,8	44,6
Statut d'emploi	Travailleur	52,1	54,6
	Au chômage ou emploi saisonnier	8,7	7,3
	À la retraite	26,4	24,7
	Autre	12,8	13,5

Population (18 ans et plus) selon le Recensement de 2011 : 12,515.

Intervalle de confiance calculé à un niveau de confiance de 95 %.

La taille de l'échantillon représente le nombre total de répondants.  
Le nombre exact de répondants varie selon l'indicateur du sondage.

n = 318

n = 276

n = 13 614

Obstacles aux services de santé	2011 (%)	2014 (%)	N.-B.(%)
Services de santé non disponibles dans votre région au moment où vous en aviez besoin	26,9 (22,1 – 31,7)	20,2 (15,5 – 24,9)	17,4 (16,7 – 18,0)
Problèmes de transport	10,4 (7,1 – 13,7)	6,4 <sup>E</sup> (3,6 – 9,3)	7,1 (6,6 – 7,5)
Problèmes de langue avec un professionnel de la santé	3,1 <sup>E</sup> (1,2 – 5,0)	F	4,2 (3,9 – 4,6)
Les médicaments coûtent trop cher	46,3 (40,9 – 51,7)	27,0 (21,8 – 32,2)	35,2 (34,3 – 36,0)
Les traitements ou les procédures coûtent trop cher	22,3 (17,6 – 26,9)	14,3 (10,1 – 18,5)	19,9 (19,2 – 20,6)
Les services d'ambulance coûtent trop cher	38,8 (32,7 – 44,8)	14,5 (9,9 – 19,1)	21,7 (20,9 – 22,4)
Difficulté à sortir de la maison en raison d'un problème de santé	15,7 (11,8 – 19,6)	14,7 (10,6 – 18,8)	12,5 (11,9 – 13,0)
Difficulté à vous y retrouver dans le système des soins de santé	13,9 (10,2 – 17,7)	8,1 <sup>E</sup> (4,9 – 11,3)	9,3 (8,8 – 9,8)
Difficulté à comprendre l'information écrite concernant une prescription pour un médicament ou son état de santé (% toujours ou habituellement)	12,0 (8,3 – 15,7)	10,2 <sup>E</sup> (6,6 – 13,8)	9,4 (8,9 – 9,9)
En ce qui concerne une prescription pour un médicament ou votre état de santé, combien de fois est-ce que ça vous a été expliqué d'une manière que vous pouviez comprendre? (% toujours ou habituellement)	91,3 (88,2 – 94,4)	92,3 (89,2 – 95,5)	91,0 (90,6 – 91,5)
<b>Choses qui contribuent beaucoup aux sentiments de stress</b>			
Pression par le temps / pas assez de temps	Non disponible	41,5 (35,7 – 47,2)	40,9 (40,1 – 41,7)
Santé des membres de la famille	Non disponible	39,1 (33,4 – 44,7)	38,1 (37,3 – 38,9)
Situation financière (pas assez d'argent, ou dettes)	Non disponible	35,1 (29,5 – 40,7)	33,5 (32,7 – 34,2)

<sup>1</sup>Pondéré par âge et par sexe selon les répondants au sondage.<sup>E</sup> À utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,7 % et 33,3 %).<sup>F</sup> Estimation trop peu fiable pour être publiée (coefficient de variation supérieur à 33,3 %).

## Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown

↑ = Pourcentage plus élevé que celui de 2011  
 ↓ = Pourcentage moins élevé que celui de 2011

	n = 318	n = 276	n = 13 614
Profil de santé	2011 (%)	2014 (%)	N.-B. (%)
Auto-évaluation de la santé (% excellente ou très bonne)	51,2 (45,7 – 56,7)	50,6 (44,8 – 56,4)	50,5 (49,6 – 51,3)
Auto-évaluation de la santé mentale ou émotionnelle (% excellente ou très bonne)	Non disponible	66,9 (61,4 – 72,4)	65,4 (64,6 – 66,2)
« Ma santé dépend en grande partie de la façon dont je prends soin de moi-même. » (% fortement d'accord)	59,3 (53,9 – 64,7)	60,8 (55,1 – 66,5)	55,2 (54,4 – 56,0)
Nombre de médicaments prescrits pris régulièrement <sup>3</sup> (% 6 ou plus)	12,5 <sup>E</sup> (8,3 – 16,7)	12,5 <sup>E</sup> (7,9 – 17,0)	15,2 (14,5 – 15,9)
Discute régulièrement avec un professionnel de la santé sur ce qui peut être fait pour améliorer la santé ou prévenir la maladie (% toujours ou habituellement)	30,0 (24,8 – 35,2)	25,5 (20,4 – 30,7)	25,4 (24,7 – 26,1)
Depuis combien de temps consultez-vous le même médecin de famille? (% 5 ans ou plus)	75,5 (70,7 – 80,3)	71,5 (66,1 – 76,9)	73,0 (72,2 – 73,7)
Êtes-vous limité dans les activités que vous pouvez faire en raison d'une condition physique ou mentale, ou d'un problème de santé? (% oui)	Non disponible	20,9 (16,2 – 25,7)	22,1 (21,4 – 22,8)
<b>Perte de mémoire</b>			
Quelqu'un dans le ménage a un problème de mémoire	Non disponible	9,3 <sup>E</sup> (5,9 – 12,7)	9,9 (9,4 – 10,4)
... qui dérange leurs activités de tous les jours	Non disponible	F	3,9 (3,6 – 4,2)
<b>Comportements liés à la santé</b>			
Consommer des fruits et légumes (% 5 portions ou plus par jour)	Non disponible	51,0 (45,1 – 56,8)	50,4 (49,5 – 51,2)
Faire de l'activité physique modérée ou intense (% au moins deux heures et demi par semaine)	Non disponible	48,5 (42,7 – 54,4)	49,0 (48,1 – 49,8)
Fumeur (% quotidien ou occasionnel)	Non disponible	16,0 (11,7 – 20,3)	19,2 (18,5 – 19,8)
Adultes dont le poids est malsain (% obèse)	Non disponible	35,3 (29,7 – 41,0)	30,8 (30,0 – 31,6)

<sup>E</sup> À utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,7 % et 33,3 %).

<sup>F</sup> Estimation trop peu fiable pour être publiée (coefficient de variation supérieur à 33,3 %).

	n = 318	n = 276	n = 276	n = 13 614
Problèmes de santé chroniques <sup>1</sup>	2011 (%)	2014 (%)	2014 <sup>2</sup> (#)	N.-B. (%)
Un ou plusieurs problèmes de santé chroniques <sup>3</sup>	62,2 (56,8 – 67,6)	63,2 (57,6 – 68,8)	7 912	61,6 (60,8 – 62,4)
Haute pression ou hypertension	25,9 (21,2 – 30,6)	26,5 (21,3 – 31,6)	3 313	27,0 (33,3 – 38,3)
Arthrite	18,5 (14,3 – 22,7)	21,1 (16,3 – 25,8)	2 635	17,4 (16,8 – 18,0)
Reflux gastrique (RGO)	23,7 (19,1 – 28,3)	15,1 (10,9 – 19,3)	1 892	16,4 (15,8 – 17,0)
Asthme	12,5 (8,9 – 16,0)	14,0 (10,0 – 18,1)	1 754	11,8 (11,3 – 12,4)
Douleur chronique	15,3 (11,4 – 19,2)	13,7 (9,6 – 17,7)	1 709	14,0 (13,5 – 14,6)
Diabète	10,5 (7,2 – 13,8)	12,9 (9,0 – 16,9)	1 618	10,7 (10,1 – 11,2)
Dépression	13,3 (9,6 – 16,9)	10,6 <sup>E</sup> (7,0 – 14,2)	1 332	14,9 (14,3 – 15,5)
Maladie cardiaque	10,4 (7,1 – 13,7)	8,1 <sup>E</sup> (4,9 – 11,2)	1 009	8,3 (7,9 – 8,8)
Cancer	7,6 <sup>E</sup> (4,8 – 10,5)	5,2 <sup>E</sup> (2,6 – 7,8)	653	8,3 (7,8 – 8,7)
Emphysème ou MPOC	F	4,1 <sup>E</sup> (1,8 – 6,4)	516	3,0 (2,7 – 3,3)
Accident vasculaire cérébral (AVC)	F	F	274	2,5 (2,2 – 2,8)
Trouble de l'humeur autre que la dépression	F	F	56	3,0 (2,7 – 3,2)

<sup>1</sup> Autodéclaré par les répondants au sondage.

<sup>2</sup> Estimation du nombre de citoyens ayant le problème de santé chronique indiqué.

<sup>3</sup> Parmi les douze problèmes de santé chroniques représentés dans le tableau de droite.

Intervalle de confiance calculé à un niveau de confiance de 95 %.

Les symboles ↑ and ↓ indiquent une différence statistiquement significative au niveau de confiance de 95 %.

La taille de l'échantillon représente le nombre total de répondants.  
 Le nombre exact de répondants varie selon l'indicateur du sondage.

## Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown

M = Meilleur que les résultats de 2011

P = Pire que les résultats de 2011

n=318

n=276

1 à 33

n=13 614

Indicateur de santé primaire		2011	2014	Rang <sup>2</sup>	N.-B.		
<b>Accessibilité</b>							
La capacité des clients d'obtenir des soins ou des services au bon endroit, au bon moment, selon leurs besoins respectifs et dans la langue officielle de leur choix.							
Médecin de famille habituel	A-1	<b>A un médecin de famille habituel</b> (% oui)	94,3 (91,8 - 96,8)	93,1 (90,2 - 96,0)	19	92,1 (91,7 - 92,5)	
	A-2	<b>Appeler le bureau du médecin de famille</b> durant les heures normales de travail (% très facile ou assez facile)	83,5 (79,3 - 87,7)	P 72,9 (67,5 - 78,3)	29	78,3 (77,6 - 79,0)	
	A-3	Le médecin de famille a des <b>heures de bureau prolongées</b> (après 17 h ou pendant la fin de semaine) (% oui)	Non disponible	27,3 (21,9 - 32,7)	3	16,2 (15,6 - 16,8)	
	A-4	Le médecin de famille a un <b>arrangement après les heures de bureau normales</b> quand le bureau est fermé (% oui)	19,1 (14,6 - 23,6)	P 10,5 <sup>E</sup> (6,8 - 14,2)	30	18,2 (17,5 - 18,9)	
	A-5	<b>Combien de temps cela a pris avant d'avoir un rendez-vous</b> avec le médecin de famille	(% le même jour ou le jour suivant)	37,4 (31,9 - 42,9)	35,1 (29,2 - 41,0)	9	30,1 (29,3 - 30,9)
			(% 5 jours ou moins)	68,3 (63,0 - 73,5)	67,3 (61,5 - 73,1)	7	60,3 (59,4 - 61,2)
	A-6	Une <b>infirmière travaillant avec le médecin de famille</b> s'occupe régulièrement des soins de santé (% oui)	61,7 (56,2 - 67,1)	P 49,0 (43,0 - 55,0)	1	27,5 (26,7 - 28,3)	
	A-7	A accès à une <b>équipe de santé primaire</b> <sup>3</sup> (% oui)	64,8 (59,6 - 70,0)	P 47,6 (41,8 - 53,4)	1	28,5 (27,8 - 29,2)	
	A-8	Période d'attente à la <b>salle d'urgence d'un hôpital</b> (% moins de 4 heures)	70,4 (60,6 - 80,2)	65,4 (54,8 - 76,0)	27	73,9 (72,7 - 75,1)	
A-9	À quelle fréquence les citoyens reçoivent les services de soins de santé dont ils ont besoin dans la <b>langue</b> officielle de leur choix (% qui reçoivent toujours les services dans la langue de leur choix)	Français <sup>4</sup>	F	59,2 <sup>E</sup> (22,8 - 95,6)	-	72,6 (71,0 - 74,2)	
		Anglais <sup>4</sup>	96,2 (94,0 - 98,4)	98,0 (96,3 - 99,7)	-	95,2 (94,8 - 95,6)	

<sup>2</sup> Indique le rang d'un indicateur parmi 33 communautés, du meilleur (1) au pire (33).<sup>3</sup> Équipe de santé primaire : Ayant accès à un médecin de famille et ayant accès soit à une infirmière praticienne, une infirmière ou d'autres professionnels de la santé au bureau du médecin de famille.<sup>4</sup> Le choix de la langue de service indiquée par le répondant dans le sondage.<sup>E</sup> À utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,7 % et 33,3 %).<sup>F</sup> Estimation trop peu fiable pour être publiée (coefficient de variation supérieur à 33,3 %).

Intervalle de confiance calculé à un niveau de confiance de 95 %.

Les symboles **M** et **P** indiquent une différence statistiquement significative au niveau de confiance de 95 %.

La taille de l'échantillon représente le nombre total de répondants. Le nombre exact de répondants varie selon l'indicateur du sondage.

**Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown**

M = Meilleur que les résultats de 2011

P = Pire que les résultats de 2011

Indicateur de santé primaire		n=318	n=276	1 à 33	n=13 614
		2011	2014	Rang <sup>2</sup>	N.-B.
<b>Justesse</b>					
Les soins ou les services fournis sont pertinents aux besoins du patient/client et sont basés sur des normes établies.					
Q-1	Adultes de 65 ans et plus ayant été <b>vaccinés contre la grippe</b> au cours des 12 derniers mois (% oui)	Non disponible	79,0 (70,6 - 87,4)	5	70,6 (69,2 - 72,0)
Q-2	Adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chronique sélectionnés <sup>5</sup> ayant subi des tests de <b>mesure de la pression artérielle</b> , au cours des 12 derniers mois (% oui)	96,1 (92,9 - 99,3)	91,4 (86,3 - 96,5)	19	91,3 (90,6 - 92,0)
Q-3	Adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chronique sélectionnés <sup>5</sup> ayant subi des tests de <b>mesure du cholestérol</b> , au cours des 12 derniers mois (% oui)	79,7 (73,0 - 86,4)	78,3 (70,6 - 86,0)	14	76,3 (75,2 - 77,4)
Q-4	Adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chronique sélectionnés <sup>5</sup> ayant subi des tests de <b>mesure de la glycémie</b> , au cours des 12 derniers mois (% oui)	76,8 (69,7 - 83,9)	82,0 (72,9 - 87,5)	5	73,9 (72,8 - 75,0)
Q-5	Adultes atteints d'au moins un des quatre problèmes de santé chronique sélectionnés <sup>5</sup> ayant subi des tests de <b>mesure du poids corporel</b> , au cours des 12 derniers mois (% oui)	61,6 (53,6 - 69,7)	68,9 (60,4 - 77,4)	3	59,3 (58,0 - 60,6)
Q-6	À quelle fréquence le médecin de famille aide les citoyens à <b>coordonner les soins</b> reçus d'autres professionnels de la santé et dans les établissements de santé (% toujours)	69,8 (63,0 - 76,6)	74,3 (67,6 - 81,0)	9	70,7 (69,7 - 71,7)
<b>Efficacité</b>					
Les soins ou les services, les interventions ou les actions mènent aux résultats souhaités.					
Q-7	À quel point les citoyens avec un problème de santé chronique <sup>7</sup> ont confiance en leur habileté à contrôler et à <b>gérer leur état de santé</b> (% très confiant)	36,3 (30,1 - 42,6)	42,5 (35,7 - 49,3)	13	42,2 (41,2 - 43,2)
<b>Sécurité</b>					
Les risques éventuels d'une intervention ou de l'environnement sont évités ou minimisés.					
Q-8	À quel point les citoyens avec un problème de santé chronique <sup>7</sup> connaissent l'effet de chacun de leurs <b>médicaments</b> prescrits (% fortement d'accord)	50,5 (43,6 - 57,4)	55,6 (48,3 - 62,9)	9	47,7 (46,6 - 48,8)
Q-9	A <b>souffert en raison d'une erreur ou d'une faute médicale</b> suite à des services de soins de santé reçus au cours des 12 derniers mois (excluant un séjour à l'hôpital) (% oui)	5,7 <sup>E,6</sup> (3,1 - 8,3)	F	-	2,7 <sup>6</sup> (2,4 - 3,0)

<sup>2</sup> Indique le rang d'un indicateur parmi 33 communautés, du meilleur (1) au pire (33).<sup>5</sup> Autodéclarée par le répondant: Diabète, maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral ou haute pression.<sup>6</sup> Pour ce type d'indicateur, un « meilleur » résultat est atteint lorsque l'indicateur a une valeur « moins » élevée.<sup>7</sup> Autodéclarée par le répondant: Arthrite, asthme, douleur chronique, emphysème ou MPOC, cancer, diabète, dépression ou autres troubles de l'humeur, maladie cardiaque, AVC, hypertension, reflux gastrique.<sup>E</sup> À utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,7 % et 33,3 %).<sup>F</sup> Estimation trop peu fiable pour être publiée (coefficient de variation supérieur à 33,3 %).

Intervalle de confiance calculé à un niveau de confiance de 95 %.

Les symboles **M** et **P** indiquent une différence statistiquement significative au niveau de confiance de 95 %.

La taille de l'échantillon représente le nombre total de répondants.

Le nombre exact de répondants varie selon l'indicateur du sondage.

**Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown**

M = Meilleur que les résultats de 2011

P = Pire que les résultats de 2011

Indicateur de santé primaire		n=318	n=276	1 à 33	n=13 614
		2011	2014	Rang <sup>2</sup>	N.-B.
<b>Rendement</b>					
Atteindre les résultats voulus en utilisant les ressources de façon rentable.					
Q-10	<b>Modèle de soins utilisé le plus souvent</b> par les citoyens lorsqu'ils sont malades ou ont besoin des soins d'un professionnel de la santé (% salle d'urgence d'un hôpital)	3,8 <sup>E6</sup> (1,7 - 5,9)	3,5 <sup>E6</sup> (1,3 - 5,7)	4	11,5 <sup>6</sup> (11,0 - 12,0)
Q-11	A utilisé le service <b>Télé-Soins</b> ou une des autres lignes téléphoniques d'information au cours des 12 derniers mois (% oui)	10,2 (6,9 - 13,5)	5,0 <sup>E</sup> (2,5 - 7,5)	28	7,4 (7,0 - 7,8)
<b>Utilisation des services</b>					
L'utilisation des services de santé primaires au cours des 12 derniers mois.					
U-1	A visité un <b>médecin de famille habituel</b> (% oui)	81,9 (77,7 - 86,1)	84,0 (79,7 - 88,3)	10	80,3 (79,6 - 81,0)
U-2	A visité la <b>salle d'urgence d'un hôpital</b> (% oui)	32,3 (27,2 - 37,4)	27,8 (22,6 - 33,0)	33	41,3 (40,5 - 42,1)
U-3	A visité un <b>spécialiste</b> (% oui)	Non disponible	54,6 (48,8 - 60,4)	19	56,4 (55,6 - 57,2)
U-4	A visité une <b>clinique « après-heures » ou sans rendez-vous</b> (% oui)	24,4 (19,7 - 29,1)	24,0 (19,0 - 29,0)	9	24,3 (23,6 - 25,0)
U-5	A visité un <b>praticien de médecine douce</b> (% oui)	Non disponible	20,1 (15,4 - 24,8)	15	25,2 (24,5 - 25,9)
U-6	A visité un <b>centre de santé communautaire</b> (% oui)	23,2 (18,6 - 27,8)	9,9 <sup>E</sup> (6,4 - 13,4)	11	6,9 (6,5 - 7,3)
U-7	A utilisé <b>des services d'ambulance</b> (% oui)	7,1 <sup>E</sup> (4,3 - 9,9)	6,6 <sup>E</sup> (3,7 - 9,5)	12	5,7 (5,3 - 6,1)
U-8	A visité une <b>infirmière praticienne</b> (% oui)	12,7 (9,0 - 16,4)	8,7 <sup>E</sup> (5,4 - 12,0)	12	7,7 (7,3 - 8,1)
U-9	A visité un professionnel de la santé à une <b>clinique privée</b> (% oui)	Non disponible	18,4 (13,9 - 22,9)	30	23,7 (23,0 - 24,4)

<sup>2</sup> Indique le rang d'un indicateur parmi 33 communautés. Sous la section « rendement », le rang est du meilleur (1) au pire (33).

Sous la section « l'utilisation des services » le rang est du plus élevé (1) au moins élevé (33).

<sup>6</sup> Pour ce type d'indicateur, un « meilleur » résultat est atteint lorsque l'indicateur a une valeur « moins » élevée.<sup>E</sup> À utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,7 % et 33,3 %).

Intervalle de confiance calculé à un niveau de confiance de 95 %.

Les symboles **M** et **P** indiquent une différence statistiquement significative au niveau de confiance de 95 %.

La taille de l'échantillon représente le nombre total de répondants.

Le nombre exact de répondants varie selon l'indicateur du sondage.

## Région de Douglas, Saint Marys, Doaktown

M = Meilleur que les résultats de 2011

P = Pire que les résultats de 2011

n=318

n=276

1 à 33

n=13 614

Indicateur de santé primaire		2011	2014	Rang <sup>2</sup>	N.-B.
<b>Communication/Relation avec le médecin de famille habituel</b>					
C-1	À quelle fréquence le médecin de famille <b>explique les choses</b> pour que les citoyens puissent comprendre (% toujours)	77,3 (71,9 - 82,6)	77,3 (72,0 - 82,6)	23	80,2 (79,5 - 80,9)
C-2	À quelle fréquence le médecin de famille <b>consulte les citoyens lors des décisions</b> au sujet de leurs soins de santé (% toujours)	66,5 (60,8 - 72,2)	69,0 (63,0 - 75,0)	19	68,2 (67,3 - 69,1)
C-3	À quelle fréquence le médecin de famille <b>donne assez de temps aux citoyens</b> pour discuter des sentiments, craintes et préoccupations au sujet de leur santé (% toujours)	69,6 (63,9 - 75,3)	73,0 (67,0 - 79,0)	13	71,9 (71,0 - 72,8)
<b>Satisfaction</b> (Évaluation globale des services de santé primaires. Une échelle de zéro à dix est utilisée pour les indicateurs où on rapporte « % 8, 9 ou 10 ».)					
S-1	<b>Services de soins de santé globaux</b> reçus au Nouveau- Brunswick (% 8, 9 ou 10)	58,2 (52,7 - 63,7)	64,3 (58,7 - 69,9)	25	67,9 (67,1 - 68,7)
S-2	Services du <b>médecin de famille habituel</b> (% 8, 9 ou 10)	77,8 (72,8 - 82,8)	84,7 (80,2 - 89,2)	13	83,9 (83,2 - 84,6)
S-3	Services à la <b>salle d'urgence d'un hôpital</b> (% 8, 9 ou 10)	48,2 (37,9 - 58,5)	56,6 (45,7 - 67,5)	8	53,4 (52,1 - 54,7)
S-4	Services d'un <b>spécialiste</b> (% 8, 9 ou 10)	Non disponible	79,6 (73,4 - 85,8)	23	82,0 (81,2 - 82,8)
S-5	Services à la <b>clinique « après-heures » ou sans rendez-vous</b> (% 8, 9 ou 10)	56,7 (44,7 - 68,7)	74,7 (63,5 - 85,9)	14	73,3 (71,6 - 75,0)
S-6	Services du <b>praticien de médecine douce</b> (% 8, 9 ou 10)	Non disponible	86,7 (77,9 - 95,5)	22	87,3 (86,2 - 88,4)
S-7	Services au <b>centre de santé communautaire</b> (% 8, 9 ou 10)	79,1 (70,1 - 88,1)	80,7 (66,8 - 94,6)	16	76,2 (73,6 - 78,8)
S-8	<b>Services d'ambulance</b> (% 8, 9 ou 10)	75,9 (57,2 - 94,6)	94,9 (84,4 - 100,0)	7	87,5 (85,3 - 89,7)
S-9	Services de <b>l'infirmière praticienne</b> (% 8, 9 ou 10)	Supprimé <sup>8</sup>	Supprimé <sup>8</sup>	-	85,8 (83,7 - 87,9)
S-10	Services à une <b>clinique privée</b> (% 8, 9 ou 10)	Non disponible	84,3 (74,6 - 94,0)	16	82,9 (81,6 - 84,2)
S-11	Évaluation du service <b>Télé-Soins</b> (% plus ou moins utile ou très utile)	82,1 (66,8 - 97,4)	70,1 <sup>E</sup> (47,7 - 92,5)	33	89,3 (87,2 - 91,4)
S-12	Évaluation des soins reçus pour la <b>santé mentale ou émotionnelle</b> (parmi les citoyens ayant consulté un professionnel de la santé) (% plus ou moins utiles ou très utiles)	81,5 (71,5 - 91,5)	86,3 (76,7 - 95,9)	26	90,8 (89,6 - 92,0)
S-13	Délai entre le moment de la <b>prise de rendez-vous</b> et celui de la visite chez le <b>spécialiste</b> (parmi les citoyens ayant consulté un spécialiste) (% plutôt satisfait ou très satisfait)	Non disponible	75,5 (68,8 - 82,2)	30	80,5 (79,6 - 81,4)

<sup>2</sup> Indique le rang d'un indicateur parmi 33 communautés, du meilleur (1) au pire (33).<sup>8</sup> Résultats supprimés dû au nombre minimale d'infirmières praticiennes.<sup>E</sup> À utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,7 % et 33,3 %).

Intervalle de confiance calculé à un niveau de confiance de 95 %.

Les symboles **M** et **P** indiquent une différence statistiquement significative au niveau de confiance de 95 %.

La taille de l'échantillon représente le nombre total de répondants. Le nombre exact de répondants varie selon l'indicateur du sondage.